

ANVENDELSE AF PRÆPARATET: DICILLIN METICILLIN

© OVL. HARDY CHRISTOFFERSEN & OVL. LIS KRØLL

STYRKE / PAKNING:	1 g injektionssubstans i hætteglas.	VIRKNING:	Penicillinastabil penicillin. Baktericid virkning. Bruges også ved blandingsinfektioner med penicillinase-naseproducerende stafylokokker.
INDIKATION:	Infektion med meticillinfølsomme bakterier.	BIVIRKNING:	Allergi.
INTERAKTION:	Virningen hæmmes ved samtidig indgift af bakteriostatisk præp. (f. eks. Erytromycin).	KONTRAINDIKATION:	Penicillinallergi.
DOSERING:	1 g 4-6 gange daglig i.v. eller i.m.	INJEKTIONSMÅDE TILBEREDNING INJEKTIONSHASTIGHED:	Til i.v. opløses 1 g i 5 ml sterilt vand. Indgives over 2-3 min.
SPECIELLE FORHOLD OBSERVATIONER:		EGNEDE INF. VÆSKER HOLDBARHED:	Bør ikke blandes i infusionsvæsker med injiceres i sidedrop. Anvendes straks.
EVT.		INFUSIONSMÅDE TILBEREDNING INFUSIONSHASTIGHED:	2-3 ml injiceret i sidedrop til løbende drop