

ANVENDELSE AF PRÆPARATET: DORMICUM

© OVL. HARDY CHRISTOFFERSEN & OVL. LIS KRØLL

STYRKE / PAKNING:	5 mg/ml injektionsvæske, 1 ml ampul.	VIRKNING:	Anxiolyticum og hypnoticum af benzodiazepin-gruppen.
INDIKATION:	Sedation / præmedikation ved anæstesi.	BIVIRKNING:	<ul style="list-style-type: none"> • Ved i.v.-indgift kan opstå flebitis. • Døsighed, svimmelhed, træthed, "hang-over" til næste dag. Ses især hos ældre. • BT-fald
INTERAKTION:	Virningen forstærkes af alkohol, andre hypnotica og morfica. Nedbrydningen sinkes af cimetidin.	KONTRAINDIKATION:	<ul style="list-style-type: none"> • Søvnapnoe. • Akut alkohol- og sovemiddelforgiftning.
DOSERING:	<ol style="list-style-type: none"> 1. præmed.: 0.07-0.1 mg/kg i.m. 2. Sedation: 1.25-2.5 mg i.v. afh. af alder og vægt. 3. Anvendes også i forbindelse med anæstesi. 	INJEKTIONSMÅDE TILBEREDNING INJEKTIONSHASTIGHED:	I.v.-injektion over 1 - 2 min.
SPECIELLE FORHOLD OBSERVATIONER:	Bevidsthedsniveau og vejrtrækning observeres. Ved respirationsdepression skal ventilation assisteres med Rubens ballon on anæstesilæge tilkaldes.	EGNEDE INF. VÆSKER HOLDBARHED:	<ul style="list-style-type: none"> • NaCl isotonisk 9 g/l • Glucose isotonisk 55 g/l <p>12 timer</p>
EVT.		INFUSIONSMÅDE TILBEREDNING INFUSIONSHASTIGHED:	