

FRAKTURA PELVIS (SIMPEL)

DIAGNOSE: S32.7

GENERELLE BEMÆRKNINGER:

Ved et simpelt bækkenbrud kan der foreligge en eller flere frakturlinier, men bækkenets stabilitet er ikke påvirket. Man bør altid tænke på evt. ledsagende intraabdominal læsion.

INITIALE UNDERSØGELSER OG BEHANDLING:

- **RØNTGENUNDERSØGELSE:** Bækken (vær opmærksom på symfyse og sacro-iliacaled).
- **TILSYN FRA ANDEN AFDELING:** Ved intraabdominal komplikation.
- **ANTIBIOTICA:** Ved ordination.

ORTOPÆDISK BEHANDLINGSMETODE:

Det simple bækkenbrud behandles konservativt med sengeleje. Pt. lejres frit. Sengelejet udstrækkes indtil rimelig smertefrihed. Derefter mobiliseres pt., som kan udskrives når funktionen er i orden.

Behandlingen vil oftest være under indlæggelse, men i nogle tilfælde kan den gennemføres i hjemmet.

- **AMBULAT BEHANDLING:** I visse tilfælde.
- **INDLÆGGELSESTID:** 1-2 uger.
- **SYGEMELDINGSPERIODE:** 4-6 uger.

EFTERBEHANDLING:

- **PATIENTLEJRING:** Se behandlingsmetode.
- **ANTIBIOTICA:** Kun ved ordination.
- **TIDSPUNKT FOR RØNTGENKONTROL:** Evt. efter 6 uger (hyppigst unødvendig).
- **FYSIOTERAPI:** Gangtræning - i starten evt. med 2 krykkestokke.
- **TIDSPUNKT FOR E.L. MED STØTTE:** Ved smertefrihed.
- **AMB. KONTROL HOS EGEN LÆGE:** Sjældent indiceret.
- **AMB. KONTROL I AFDELINGEN:** Evt. efter 6 uger (se ovenfor).