

ANVENDELSE AF PRÆPARATET: GARAMYCIN GENTAMICIN

© OVL. HARDY CHRISTOFFERSEN & OVL. LIS KRØLL

<b>STYRKE / PAKNING:</b>	40 mg/ml 2 ml hætteglas injektionsvæske	<b>VIRKNING:</b>	Baktericidt aminoglykosid.
<b>INDIKATION:</b>	Alvorlige infektioner med aminoglycosid-følsomme bakterier.	<b>BIVIRKNING:</b>	Allergiske, sjældne. Toksisk: nyrebeskadigelse med tubulær nekrose, beskadigelse af hørelse og mange andre.
<b>INTERAKTION:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Potenseret virkning sammen med penicillinase stabile præparater.</li> </ul>	<b>KONTRAINDIKATION:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Allergi.</li> <li>Relativ kontraindikation ved nedsat nyrefunktion.</li> </ul>
<b>DOSERING:</b>	<p>3 mg/kg (ca. 240 mg) i.v. pr. døgn. Kan øges til 5 mg pr. kg pr. døgn.</p> <p>Fordeles over 1-2 doser pr. døgn.</p>	<b>INJEKTIONSMÅDE TILBEREDNING INJEKTIONSHASTIGHED:</b>	Gives som bolusinjektion over nogle få min.
<b>SPECIELLE FORHOLD OBSERVATIONER:</b>	Serumkoncentrationen af garamycin skal følges ved længere varende behandling og især ved nedsat nyrefunktion. Behandlingsperioden bør kun på særlig indikation være på mere end 10 dage.	<b>EGNEDE INF. VÆSKER HOLDBARHED:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>NaCl isotonisk 9 g/l</li> <li>Glucose isotonisk 55 g/l</li> </ul>
<b>EVT.</b>		<b>INFUSIONSMÅDE TILBEREDNING INFUSIONSHASTIGHED:</b>	Må ikke blandes med andre lægemidler.