

ANVENDELSE AF PRÆPARATET: LANEXAT

© OVL. HARDY CHRISTOFFERSEN & OVL. LIS KRØLL

STYRKE / PAKNING:	0.1 mg/ml injektionsvæske. Ampuller á 5 ml.	VIRKNING:	Specifikt virkende antidot til benzodiazepiner. Virkning indtræder efter få min.
INDIKATION:	Ophævelse af benzodiazepiners virkning.	BIVIRKNING:	Kvalme, opkastning. Ved hurtig i.v.-injektion hjertebanken og angst samt abstinens-symptomer ved benzodiazepinbehandling.
INTERAKTION:		KONTRAINDIKATION:	<ul style="list-style-type: none"> Allergi over for flumazenil. Forsigtighed ved børn under 15 år.
DOSERING:	<ul style="list-style-type: none"> Ophævelse af anæstesi/analgesi: 0.2 mg (2 ml) i.v. Gives evt. yderligere 0.1 mg (1 ml) med 1 min mellemrum til ønsket effekt er opnået, i alt dog højst 1 mg. Forgiftning: 0.3 mg (3 ml) i.v. Gives evt. med 1 min mellemrum til ønsket effekt er opnået, i alt dog højst 2 mg (20 ml) 	INJEKTIONSMÅDE TILBEREDNING INJEKTIONSHASTIGHED:	i.v.
SPECIELLE FORHOLD OBSERVATIONER:	Vær opmærksom på abstinenssymptomer. Kan afhjælpes med i.v.-indgift af 5 mg diazepam.	EGNEDE INF. VÆSKER HOLDBARHED:	<ul style="list-style-type: none"> NaCl isotonisk 9 g/l Glucose isotonisk 55 g/l 12 timer
EVT.		INFUSIONSMÅDE TILBEREDNING INFUSIONSHASTIGHED:	<ul style="list-style-type: none"> 2 mg (20 ml) tilsættes 500 ml NaCl eller glucose-inf. Den fremstillede blanding indeholder 4 mikrogram/ml Dosering individuel afhængig af respons. Vedligeholdelsesbehandling: 0.1-0.4 mg svarende til 25-100 ml infusionsbehandling pr. time..