

## ANVENDELSE AF PRÆPARATET: NARCANTI

© OVL. HARDY CHRISTOFFERSEN & OVL. LIS KRØLL

<b>STYRKE / PAKNING:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0.02 mg/ml injektionsvæske. 2 ml ampuller</li> <li>• 0.4 mg/ml injektionsvæske. 1 ml ampuller</li> </ul>	<b>VIRKNING:</b>	Specifik antidot til opioider, uden egen virkning.
<b>INDIKATION:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Overdosering</b> af opioider incl. dextropropoxyphen og pentazocin</li> <li>• <b>Forgiftning</b> med samme.</li> </ul>	<b>BIVIRKNING:</b>	Tremor, ildebefindende og opkastninger er rapporteret, kan tydes som opioid-abstinenssymptomer.
<b>INTERAKTION:</b>		<b>KONTRAINDIKATION:</b>	Ingen
<b>DOSERING:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Overdosering:</b> 0.1 - 0.2 - 0.4 mg i.v. evt. gentaget.</li> <li>• <b>Forgiftning:</b> (0.4) - 0.8 mg i.v. evt. gentaget.</li> </ul>	<b>INJEKTIONSMÅDE</b> <b>TILBEREDNING</b> <b>INJEKTIONSHASTIGHED:</b>	Kan gives i.m. og i.v.
<b>SPECIELLE FORHOLD</b> <b>OBSERVATIONER:</b>	Den tynde opl. givel evt. efter nærmere ordination til nyfødte, hvis mødre har fået opioider. <b>HUSK:</b> virkningen af Narcanti ofter er kortere end opioidernes - derfor suppl. evt. med i.m.-injektion.	<b>EGNEDE INF. VÆSKER</b> <b>HOLDBARHED:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NaCl isotonisk 9 g/l</li> <li>• Glucose isotonisk 55 g/l</li> </ul> <p>12 timer.</p>
<b>EVT.</b>		<b>INFUSIONSMÅDE</b> <b>TILBEREDNING</b> <b>INFUSIONSHASTIGHED:</b>	Ved kontinuerlig infusion blandes 2 mg Narcanti (5 ampuller á 0.4 mg/ml) med 500 ml NaCl eller Glucose isot. infusion.  Individuel