

## NEUROMA PEDIS MORTON'S SYGDOM

**DIAGNOSE: G57.6**

### GENERELLE BEMÆRKNINGER:

Neuromdannelse på communis-nervernes delingssted er ikke ualmindelig.

De kliniske symptomer er radierende smerter og nedsat sensibilitet sv. t. de afficerede proprius-nerver.

### INITIALE UNDERSØGELSER OG BEHANDLING:

- **RØNTGENUNDERSØGELSE:** Forfod i to planer.

### ORTOPÆDISK BEHANDLINGSMETODE:

**Konservativ behandling:** indlæg, der støtter bag metatarsale capituli.

**Operativ behandling:** i lokalanæstesi og blodtomhed (BT-manchet på crus) anlægges længdegående incision på dorsalsiden. Incisionen føres helt ned i interstitset. Nerverne isoleres. Neuromet excideres. Der anlægges hudsutur. Såret forbindes med tør forbindelse, og der anlægges elastisk bind.

- **AMBULANT BEHANDLING:** Ja.
- **SYGEMELDINGSPERIODE:** 2 uger.

### EFTERBEHANDLING:

- **BANDAGERING:** Tør forbindelse.
- **PATIENTLEJRING:** Pt. tilrådes elevation de første 2-3 dage.
- **TIDSPUNKT FOR FJERNELSE AF SUTURER:** 14. dag.
- **TIDSPUNKT FOR E.L. MED STØTTE:** Straks.
- **AMB. KONTROL HOS EGEN LÆGE:** 14. dag. Suturer fjernes. Yderligere kontrol ikke nødvendig.