

ANVENDELSE AF PRÆPARATET: PENICILLIN **BENZYL**PENICILLIN

© OVL. HARDY CHRISTOFFERSEN & OVL. LIS KRØLL

| | | | |
|---|--|---|--|
| STYRKE / PAKNING: | 1 mill IE, 2 mill IE og 5 mill IE injektionssubstans i htgl. | VIRKNING: | Antibioticum med baktericid virkning. Hæmmer bakteriers dannelse af cellevæg hos grampositive og nogle gramnegative bakterier. |
| INDIKATION: | Infektioner forårsaget af penicillinfølsomme bakterier. | BIVIRKNING: | <ul style="list-style-type: none"> • Allergi. Diagnosen penicillinallergi afkræftes hos 95% af pt., der hævder at være allergiske. • Neurotoksis ved indgift af store doser (40-100 mill IE) i.v. |
| INTERAKTION: | Virningen hæmmes ved samtidig indgift af bakteriostatiske præparater f. eks. Erythromycin. | KONTRAINDIKATION: | Kendt penicillinallergi. |
| DOSERING: | 1 - 2 mill IE i.v./i.m. 2 gange i døgnet. Ved svære infektioner 5 - 10 mill IE 2 - 4 gange i døgnet. Ved døgndosis på 10 mill IE og derover anvendes intermitterende i.v.-infusion. | INJEKTIONSMÅDE TILBEREDNING INJEKTIONSHASTIGHED: | <ul style="list-style-type: none"> • Anvendes i.m. eller i.v. • 1 mill: tørstof opløses i 1.5-5 ml sterilt vand. • 2 mill: tørstof opløses i 3-5 ml sterilt vand. • 5 mill: tørstof opløses i 8-10 ml sterilt vand. • Opløses tørstoffet i 8 ml sterilt vand fås 10 ml penicillinopl. med 500.000 IE/ml. |
| SPECIELLE FORHOLD OBSERVATIONER: | 1 mill IE Penicillin-substans indeholder 1.7 nmol Na. | EGNEDE INF. VÆSKER HOLDBARHED: | NaCl isotonisk 9 g/l 24 timer ved 4 grader og 2 timer ved stuetemp. |
| EVT. | | INFUSIONSMÅDE TILBEREDNING INFUSIONSHASTIGHED: | Intermitterende i.v.-infusion Penicillintørstof opløses ved i.v.-injektion. Opløsningen tilsættes til 100 ml isot. NaCl inf. Indgives over 20-30 min. |