

ANVENDELSE AF PRÆPARATET: PETIDIN

© OVL. HARDY CHRISTOFFERSEN & OVL. LIS KRØLL

STYRKE / PAKNING:	50 mg/ml injektionssubstans. Ampuller af 1 ml.	VIRKNING:	Central smertedæpende virkning.
INDIKATION:	Akutte, stærke smerter, cancersmerter. Præoperativ medikation og postoperativ analgesi.	BIVIRKNING:	Kvalme, opkastning, konfusion, svimmelhed, eufori, eufomani, vandladningsbesvær, obstipation, respirationssvækkelse og dødsighed.
INTERAKTION:	Ved samtidig indgift af monoaminoxidase-hæmmere ses ekscitation, hyperpyreksi, kramper samt hyper/hypotension. Virkning af neuroleptica forstærkes. Virkning af benzodiazepiner, barbiturater og alkohol forstærkes.	KONTRAINDIKATION:	Respirationsinsufficiens. Svær lever- og nyrelidelser er relativt kontraindikation.
DOSERING:	10 - 25 - (50) mg i.v.	INJEKTIONSMÅDE TILBEREDNING INJEKTIONSHASTIGHED:	Langsomt i.v. direkte. Stoffet er lokalt kar-irriterende og injektionsvæsken kan med fordel fortyndes til 10 mg/ml. Langsomt
SPECIELLE FORHOLD OBSERVATIONER:	Ved langtidsbehandling risiko for kumulation af nedbrydningsproduktet norpetidin.	EGNEDE INF. VÆSKER HOLDBARHED:	<ul style="list-style-type: none"> • NaCl isotonisk 9 g/l • Glucose isotonisk 55 g/l 12 timer
EVT.		INFUSIONSMÅDE TILBEREDNING INFUSIONSHASTIGHED:	