

SYMPTOMER PÅ DYKKERSYGE

DIAGNOSE: T70.3

SE ENDVIDERE : [Akut undersøgelse af dykkersyge i skadestuen](#)

Type I SYMPTOMER:

- Hudkløe
- Ledsmerter i albue, hånd, fingre, knæ og fødder.
- Subkutant emfysen på halsen.
- Hudforandringer (cutis marmorata).
- Lokaliseret lymfødem.

Type I symptomer er ikke livstruende, men er alle behandlingskrævende.

Eneste undtagelse er hudkløen.

TYPE II SYMPTOMER:

- **Ethvert tænkeligt neurologisk udfald:**
 - Sensibilitetsforstyrrelser
 - Balanceusikkerhed (svimmelhed, koordinationsforstyrrelse)
 - Kraftnedsættelser eller pareser
 - Synsforstyrrelser
 - Hørenedsættelse og/eller susen for ørerne
 - Ændret personlighed (opstemt eller deprimeret)
 - Ændrede senerefeks (forstærkede (udvidet reflexogen zone, evt. efterslag), svækkede, asymmetriske)
 - Babinski refleks
 - Abnorm træthed
- Brystsmerter
- Smerter i hofte og skulderled
- Abdominalsmerter

Type II symptomer kan optræde i alle sværhedsgrader. Ved type II symptomer er der en absolut behandlingsindikation, idet de kan medføre blivende invaliditet og endog være livstruende. OBS Ethvert symptom, der indtræder indenfor 24 timer efter dykning, betragtes som dykkersyge, indtil det modsatte er bevist.

Der behøver kun være et eller få af ovenstående symptomer tilstede. Lidelsen kan være progredierende. Diskrete symptomer, som en dykker hen vender sig med i en skadestue, kan forværres i løbet af få timer.

Allerede på dette tidspunkt bør konfereres med en dykkerlæge vedrørende videre visitations- og behandlingsforløb. Vagthavende dykkerlæge træffes via **Søværnets operative Kommando, SOK: Telefon: 89 43 30 99** (døgnvagt).