

UNGVIS INCARNATUS

DIAGNOSE: L60.0

GENERELLE BEMÆRKNINGER:

Ptt. med nedgroede negle har ofte fået langvarig konservativ behandling, inden ptt. henvises til sygehus.

INITIALE UNDERSØGELSER OG BEHANDLING:

- **RØNTGENUNDERSØGELSE:** Ikke nødvendig i klasiske tilfælde.

ORTOPÆDISK BEHANDLINGSMETODE:

Behandlingen gennemføres ambulantly.

Er der betændelse i neglelejet, skal pt. dagligt bade foden i sæbevand (brun sæbe), indtil infektionen falder til ro og den operative behandling kan gennemføres.

Operation: i lokalanæstesi og lokal blodtomhed fjernes neglen. Man recesserer herefter de laterale neglevolde. Resektion skal gå både distalt og proksimalt for neglelejet - i dybden skal laterale del af neglelejet være indbefattet. Der sættes kun 1 eller 2 suturer. Der pålægges vaselinge og anlægges komprimerende forbinding.

- **AMBULANT BEHANDLING:** Ja.
- **SYGEMELDINGSPERIODE:** 2-3 uger.

EFTERBEHANDLING:

- **BANDAGERING:** Komprimerende forbinding.
- **PATIENTLEJRING:** Pt. tilrådes til elevation de første 2 døgn.
- **TIDSPUNKT FOR FORBINDSSKIFTNING:** 3-4 dage hos e.l.
- **TIDSPUNKT FOR FJERNELSE AF SUTURER:** 14. dag hos egen læge.
- **TIDSPUNKT FOR E.L. MED STØTTE:** Straks.
- **AMB. KONTROL HOS EGEN LÆGE:** 3-4 dage, 14. dag og efter behov.