

ANVENDELSE AF PRÆPARATET: ZINACEF CEFUROXIM

© OVL. HARDY CHRISTOFFERSEN & OVL. LIS KRØLL

STYRKE / PAKNING:	<ul style="list-style-type: none"> • 750 mg injektionssubstans i hætteglas. • 1.5 g injektionssubstans i hætteglas eller monoval. 	VIRKNING:	Baktesisidt over for grampos. og gramneg. bakterier efter resistensbestemmelse. Hæmmer dannelse ad cellevægi bakterier.
INDIKATION:	<ul style="list-style-type: none"> • Initialbeh. af sepsis af ukendt ætiologi (+ aminoglycosid) • Som ved penicillin. Følsomme bakterier efter resistensbestemmelse. 	BIVIRKNING:	Nefrotoksisk i høje doser.
INTERAKTION:	<ul style="list-style-type: none"> • Virkningen hæmmes ved samtidig indgift af bakteriostatisk præp. (f. eks. Erytromycin). • Virkningen øges ved samtidig indgift af aminoglykosider. • Loopdiuretica øger nefrotoksiciteten. 	KONTRAINDIKATION:	Cefalosporinallergi (10% af penicillinallergikere).
DOSERING:	0.75 - 1.5 g 3 gange i døgnet.	INJEKTIONSMÅDE TILBEREDNING INJEKTIONSHASTIGHED:	I.v. <ul style="list-style-type: none"> • 250 mg i 2 ml sterilt vand • 750 mg i 6 ml sterilt vand • 1.5 g i 15 ml sterilt vand Indgives over 3 min. Holdbar i 5 timer (24 timer i køleskab).
SPECIELLE FORHOLD OBSERVATIONER:	Allergi.	EGNEDE INF. VÆSKER HOLDBARHED:	<ul style="list-style-type: none"> • NaCl isotonisk 9 g/l • Glucose isotonisk 55 g/l 12 timer
EVT.		INFUSIONSMÅDE TILBEREDNING INFUSIONSHASTIGHED:	1.5 g opløses i infusionsvæske og indgives over 20 - 30 min evt. via sidedrop. Indgives over mindst 30 min.